

ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА

Бешенство – это вирусное инфекционное заболевание, которое характеризуется поражением центральной нервной системы и представляет огромную опасность, как для животных, так и для человека.

Основными источниками бешенства являются дикие хищные животные (лисы, волки, енотовидные собаки и др.), но бешенством могут заболеть практически все виды наземных млекопитающих, в том числе домашние и бродячие собаки и кошки.

В Республике Беларусь ежегодно регистрируются случаи заболевания бешенством среди животных: диких (лисы, енотовидные собаки, волки и др.), домашних (собаки, кошки) и сельскохозяйственных (крупный рогатый скот, лошади, мелкий рогатый скот), что существенно повышает риск возникновения случаев бешенства среди населения.



Заражение человека и животных

происходит при непосредственном контакте со слюной инфицированного животного – при укусах, царапинах, а также загрязнении кожных покровов и слизистых оболочек слюной больного животного. Наиболее опасны укусы в голову, кисти рук, стопы. Возможно заражение человека при снятии шкур с диких плотоядных животных.

Больные животные выделяют вирус со слюной в последние дни инкубации и на протяжении всего периода болезни вплоть до

его гибели.

Инкубационный период (от момента попадания вируса в организм до появления симптомов заболевания) составляет от 10 дней до нескольких месяцев, известны случаи его удлинения до 1 года. Длительность заболевания в среднем колеблется от 3 до 7 дней.

Первые симптомы заболевания могут проявляться в месте нанесенного повреждения в виде мышечных подергиваний, зуда, тянущие боли по ходу нервов. В начале заболевания отмечаются беспричинная тревога, страх, повышенная чувствительность к световым и звуковым раздражителям, незначительное повышение температуры тела. Впоследствии могут присоединяться приступы водобоязни: болезненные спазмы мышц глотки и гортани при попытке попить, при звуках льющейся воды. Общее возбуждение может перейти в ярость, агрессию. Стадия возбуждения сменяется паралитической стадией и больной погибает.

Бешенство – абсолютно смертельное заболевание. Единственным эффективным средством профилактики является своевременное оказание антирабической помощи лицам,

пострадавшим от контакта с животным, в том числе проведение иммунизации против бешенства.

В случае получения травм при контакте с дикими, безнадзорными и домашними животными (укусы, оцарапывание, ослюнение слизистых оболочек и кожных покровов, нанесенных любым, даже здоровым на внешний вид животным) необходимо промыть рану под струей воды с мылом, края раны смазать йодом или любым спиртосодержащим антисептиком, наложить стерильную повязку и немедленно (в течение суток) обратиться в медицинское учреждение для получения антирабической помощи.

Специализированная антирабическая помощь (лечебно-профилактическая иммунизация против бешенства) в г. Гродно оказывается **круглосуточно**:

взрослому населению – в травматологическом пункте УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно» (г. Гродно, ул. Советских пограничников, д.115);

детскому населению – в УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница» (г. Гродно, ул. Островского, 22).

Врач-травматолог (хирург) в каждом конкретном случае решает вопрос о необходимости назначения вакцинации против бешенства. Необходимо строго соблюдать рекомендации врача и прививаться в соответствии со схемой вакцинации, так как **самовольное прерывание курса вакцинации, отказ от прививок могут иметь печальные последствия.**

Кому также необходимо прививаться от бешенства с профилактической целью?



Людям, которые по роду своей деятельности могут контактировать с больными бешенством животными (ветеринарные специалисты, охотники, лесники, егеря, работники боен; лица, выполняющие работы по отлову и содержанию безнадзорных животных, таксидермисты; лица, работающие с диким вирусом бешенства).

Для данной категории граждан профилактическая вакцинация проводится в амбулаторно-поликлинических организациях г. Гродно и Гродненского района по следующей схеме: на 0 день, на 7 и на 30 день (всего 3 дозы). С целью поддержания

иммунитета ревакцинацию проводят через 1 год, а затем через каждые 3 года.

АВТОР:

врач-эпидемиолог

Былич В.А.

июль 2026